

IL MICOLOGO

Periodico dell' "A.M.B.A.C. - CUMINO APS" - Piazza Borelli, 6 - 12012 BOVES CN

75

N° 168 - anno IV
Dicembre 2023

POSTE ITALIANE s.p.a.
Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n. 46)
Art. 1, comma 2 e 3

TAXE PERÇUE
TASSA RISCOSSA
Cuneo C.P.O.

In caso di mancato recapito restituire al C.R.P. CUNEO - C.P.O. per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa



Mycena fontqueri Maire

Coprinopsis strossmayeri

(Schulzer) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001

Rémi PÉAN

3 ruelle du Vieux Puits - Sorges - 49130 Les Ponts de Cé (F)

e-mail: remi.pean@shunsoft.net

Résumé

Coprinus strossmayeri, créé par Schulzer en 1879, ne semble pas avoir été revu entre cette date et notre récolte de 1996, tout du moins en France.

En 1998, Jean Mornand créa *Coprinus populicola*, devenu en 2001 *Coprinopsis strossmayeri*.

Summary

Coprinus strossmayeri, created by Schulzer in 1879, does not seem to have been seen again between that date and our 1996 harvest, at least in France.

In 1998, Jean Mornand created *Coprinus populicola*, which became *Coprinopsis strossmayeri* in 2001.



Coprinopsis strossmayeri

Foto R. Péan

Division - Classe - Ordre - Famille

Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Psathyrellaceae

Synonymes

Coprinus strossmayeri Schulzer (1879) [1878], Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 28, p. 430 (Basionyme)

Coprinus rhizophorus Kawamura (1954), Icones of Japanese Fungi 5: 559

Coprinus rhizophorus Kawamura ex Hongo & K. Yokoyama (1976), Transactions of the mycological Society of Japan, 17(2), p. 140

Coprinus tomentosus ss. M.M. Moser (1983), Kleinen kryptogamenflora von Mitteleuropa, band 2b/2, Edn 5, p.

Coprinus populicola Mornand (1998), Documents mycologiques, 28(109-110), p. 69

Coprinus strossmayeri var. *populicola* (Mornand) Bon (2002), Documents mycologiques, 31(124), p. 20

Coprinopsis strossmayeri (Schulzer) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001), Taxon, 50(1), p. 231 (nom actuel).

Introduction

Le 16 mai 1996, nous récoltons à Sorges en Maine et Loire un coprin qui pousse par centaines d'exemplaires sur bois de peuplier moussu, pourri au sol.

Devant notre incapacité à déterminer ce champignon, pourtant ressemblant à un *Coprinus atramentarius*, nous l'adressons à Michel Citérin, spécialiste des coprins.



Coprinopsis strossmayeri

Foto D. Gramain

Il ne connaît pas!

Jean Mornand, mycologue angevin de haut niveau (ancien président de la Société Mycologique de France) pense qu'il s'agit d'une espèce nouvelle et, en 1998, crée notre champignon sous le nom de *Coprinus populicola*.

Surprise! en 2001, des mycologues découvrent que notre récolte a déjà été décrite en 1879 sous le nom de *strossmayeri*. Priorité est donnée à ce nom.

Nous en avons revu quelques dizaines d'exemplaires en 1997, puis plus rien depuis.

Belle histoire quand même!

Chapeau: 0,8-6 cm de diamètre, beige à brunâtre surtout au centre avec un abondant voile blanc puis ocracé et écailleux.

Lames: blanches à grises, ascendantes et libres.

Stipe: 2-10 × 0,3-1 cm, un peu pelucheux, à base avec de longs cordons mycéliens brun orange à brun sombre.

Microscopie: Spores : 8-9 × 5-6 µm, ovoïdes à ellipsoïdales à pore germinatif net. Voile constitué d'hyphes diverticulées.

Ecologie: espèce printanière poussant en très grand nombre, autour ou sur les troncs de peupliers morts.

Comestibilité: sans intérêt.



Coprinopsis strossmayeri

Foto R. Péan

Références bibliographiques:

- EHRARD L. - (200-2001): *Studies in Coprinus d'Ulje*, Pilzkompendium Band 1.
- ROUX P. - 2006: *Mille et un champignons* Ed. P. Roux.

Commentaires:

Coprinus strossmayeri est un *Coprinus atramentarius* à voile écailleux. Odeur de vieux fût non lavé ou de vin ordinaire.

Coprinopsis strossmayeri

Riassunto

Coprinus strossmayeri, creato da Schulzer nel 1879, non sembra essere stato rivisto tra questa data e il nostro raccolto del 1996, almeno in Francia. Nel 1998, Jean Mornand creò *Coprinus populicola*, diventato nel 2001 *Coprinopsis strossmayeri*.

Il 16 maggio 1996, abbiamo raccolto a Sorges nel Maine e nella Loira un coprinus che cresce a centinaia di esemplari su legno di pioppo muschiato, marcescente a terra. Di fronte alla nostra incapacità di determinare questo fungo, eppure simile a un *Coprinus atramentarius* (vedi foto in quarta di copertina - ndr), lo proponiamo a Michel Citérin, specialista di coprinus, lui non lo conosce!

Jean Mornand, micologo di alto livello (ex presidente della Società Micologica di Francia) pensa che si tratti di una nuova specie e, nel 1998, ha creato il nostro fungo con il nome di *Coprinus populicola*.

Sorpresa! Nel 2001, i micologi scoprono che il nostro raccolto è già stato descritto nel 1879 con il nome di *strossmayeri*. La priorità è data a questo nome.

Abbiamo rivisto alcune decine di esemplari nel 1997, poi niente più da allora. Bella storia comunque.

Cappello: 0,8-6 cm di diametro, da beige a brunastro soprattutto nel centro con un abbondante velo bianco poi ocraceo e squamoso.

Lamelle: da bianche a grigie, ascendenti e libere.

Gambo: 2-10 × 0,3-1 cm, un po' soffice, a base con lunghi cordoni miceliari da marrone arancio a marrone scuro.

Microscopia: spore: 8-9 × 5-6 µm, ovoidi a ellissoidali a poro germinativo netto. Velo costituito da ife diverticolate.

Habitat: specie primaverile che cresce in numero molto elevato intorno o su tronchi di pioppi morti.

Commestibilità: senza interesse.

Commenti: *Coprinus strossmayeri* è un *Coprinus atramentarius* a velo squamoso. Odore di vecchia botte non lavata o di vino ordinario.